

뇌졸중 환자에게 스타틴 복용이 왜 필요한가요?



weknew

x



대한뇌졸중학회
Korean Stroke Society

고지혈증이 위험한 이유

고지혈증은 뇌경색을 발생시키는 위험인자로
전신 혈관에 동맥경화증을 일으킬 수 있습니다.



고지혈증 진단

LDL 콜레스테롤이 160mg/dL 이상인 경우 고지혈증으로 진단하고 생활 습관 교정과 함께 스타틴 등의 고지혈증 치료를 시작합니다.



“LDL 콜레스테롤을 낮추면?”

LDL 콜레스테롤 70mg/dL을 목표로 낮춘 환자는
90-110mg/dL로 유지한 환자에 비해
뇌경색을 포함한 심혈관 질환 발생률을
22% 줄일 수 있어요.




“뇌경색 발생 후 고지혈증 관리가 필요해요”

따라서 뇌경색 발생 이후 고지혈증을 더욱 적극적으로 관리해야 하며 목표 LDL 콜레스테롤 수치를 정해서 조절해야 합니다.



스타틴 부작용

스타틴을 복용하면 소화장애, 속쓰림, 복통뿐만 아니라
간독성, 근육 독성, 당뇨병 등의 부작용이 발생할 수 있어요.



스타틴 부작용 < 심뇌혈관 질환 예방 효과

하지만 스타틴 복용으로 인한 부작용보다
심뇌혈관질환 발생 예방 효과가 훨씬 크답니다.
따라서 정기적인 검진을 통해 의사와 상의 후
스타틴을 복용해야 해요.





소중한 사람들에게
올바른 건강 정보를
공유하세요



weknew